LES RECOMMANDATIONS POUR BIEN TRAITER CONTRE LES PARASITES DU CHIEN

LES PRINCIPAUX PARASITES





Les principaux parasites externes



Les principaux parasites internes

LES CAS COURANTS SELON L'ESCCAP [2]

	Les chiens avec peu de contacts*	Les chiens avec un accès régulier à l'extérieur Est-ce qu'il chasse, mange de la viande crue ou peut manger des escargots / limaces ?		Chien vivant dans une région endémique d'*E. multilocularis* et pouvant chasser / manger des proies
		Non	Oui	
Vers ronds	Coproscopie et/ou traitement 1 à 2 fois par an	Coproscopie et/ou traitement 4 fois par an	Coproscopie et/ou traitement 4 à 12 fois par an	
Vers plats	-	-	Coproscopie et/ou traitement 4 à 12 fois par an	Traitement 12 fois par an
Puces	Traitement si signe de présence	Traitement préventif régulier ou toute l'année		
Tiques	Traitement si situation à risque ou signe de présence	Traitement préventif continu pendant la "saison des tiques"		
Exemples de produit ou d'association de produits	par an	par an	par an	par an
	par an	par an	par an	par an

Selon l'ESCCAP, chiens qui n'ont pas de contacts avec d'autres chiens, ne vont pas dans les parcs ou les bacs à sable, ne rencontrent pas d'escargots/limaces, ne mangent pas de viande crue et ne chassent pas.

LES CAS PARTICULIERS SELON L'ESCCAP[3]

Chiots

De 2 semaines d'âge à 2 semaines après le sevrage (~3 mois)	De 2 semaines après le sevrage (~3 mois) à 6 mois	Chiens vivant en collectivité	Chiens vivant avec des enfants de moins de 5 ans ou des personnes immunodéprimées	Chiennes allaitantes	Chiennes en gestation
Traitement vers ronds et vers plats : à partir de 6 semaines toutes les 2 semaines	Traitement vers ronds et vers plats : une fois par mois.	Vers ronds et vers plats : Coproscopie et/ou traitement une fois par mois	Vers ronds et vers plats : Coproscopie et/ou traitement une fois par mois	Vers ronds et vers plats : Traitement en même temps que le premier traitement des chiots	Vers ronds : Traitement avec lactones macrocycliques aux 40e et 55e jours de gestation
Puces : dès 2 semaines tous les mois[4]	Puces : Une fois par mois	Traitement préventif régulier ou toute l'année	Traitement préventif régulier ou toute l'année	Traitement préventif régulier ou toute l'année	Traitement préventif régulier ou toute l'année

Tiques :
Traitement préventif continu pendant la "saison des tiques"

(1) Selon l'ESCCAP, la gale otodectique est la principale cause d'otite chez le chien, le chat et le furet.
(2) ESCCAP: Worm Control in Dogs and Cats 6th Edition Guidelines May 2021 (diagramme page 9); et : AR-17582 dans VV, ESCCAP: Control Of Ectoparasites In Dogs And Cats Guidelines 2022.
(3) ESCCAP: Worm Control in Dogs and Cats 6th Edition Guidelines May 2021, p.9.
(4) En respectant les RCP des produits.



CHAQUE PATIENT EST UNIQUE, SON TRAITEMENT AUSSI !

zoetis

MM-23191